



المملكة المغربية

المملكة المغربية



وزارة الفلاحة والصيد البحري

طريق التسويق في زراعة الحبوب



مديرية التعليم والتكوين والبحث
قسم الإرشاد

إعداد : محمد الغروض
معهد الوطني للبحث الزراعي

2010

المملكة المغربية



وزارة الفلاحة والصيد البحري

1- المؤهل الأساسية لعم وتطور الثروات

العام

الجهة

2- تأثير التغير المناخي

العوامل الكبيرة والثانوية

العناصر المائية

3- مسارات التنمية المستدامة

طرق التسميد في زراعة الحبوب

تحاليل التربة

ما هو قانون الحد الأدنى

3- دور وأعراض النقص بال بالنسبة للعناصر الكبيرة

الأزوج

ما هو دور الأزوج؟

ما هي أعراض النقص؟

الذروة

ما هو دور الذروة؟

ما هي أعراض النقص؟

الدكتور محمد الفروض

المعهد الوطني للبحث الزراعي

فهرس

5	مقدمة
7	١- العوامل الأساسية لنمو وتطور النبات
	الماء
	الضوء
	غاز ثاني أكسيد الكربون
	العناصر الكبرى والثانوية
	العناصر الصغرى
8	٢- أساسيات التغذية المعدنية
	ما هي العناصر الأساسية؟
	تقييم خصوبة التربة
	طرق تقييم خصوبة التربة
	اختبار أعراض نقص العناصر
	تحاليل التربة
	ما هو قانون الحد الأدنى؟
13	٣- دور وأعراض النقص بالنسبة للعناصر الكبرى
13	الأزوت
	ما هو دور الأزوت؟
	ما هي أعراض النقص؟
14	الفوسفور
	ما هو دور الفوسفور؟
	ما هي أعراض النقص؟

16	<p>البوتاسيوم ما هو دور البوتاسيوم؟ ما هي أعراض النقص؟</p>
18	<p>الأسمدة الأزوتية الأسمدة الفوسفاتية الأسمدة المختلطة أو المركبة</p>
21	<p>5- التوصيات كيف يمكن لنا أن نعرف كمية ونوعية السماد الذي يجب إضافته؟ أسمدة العمق أسمدة التغطية بالنسبة للحبوب الوقت الملائم لإضافة الأسمدة</p>
	<p>٤١</p>
	<p>٤٢</p>

النباتات مثل الكائنات الحية الحيوانية تحتاج من أجل نموها وتطورها إلى حملة من العوامل الأساسية التغذوية وانماط أوراق لها قد تحدد هذه العوامل من الوسط الذي يعيش النبات سلوكه تجاه ذلك الوسط وعمر ذلك النبات الذي يعيش في شروط غير كاملة وغير ملائمة.

تقديم

من المعروف أن الأسمدة من المدخلات القوية المعززة للإنتاجية. والواقع أن ثلث الزيادة في إنتاج الحبوب على نطاق العالم يرجع إلى عوامل ذات صلة بالأسمدة. وأن استخدام الأسمدة ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة للتوصيل إلى زيادة الإنتاج الغذائي.

تلعب الأسمدة المعدنية دوراً مهماً في تحسين الإنتاج من الناحية الكمية والكيفية. وتعمل على تزويد النبات بما يحتاجه من غذاء من أجل نموه وتطوره. إذ أن النبات يعيش وينمو ويتكاثر من خلال الحصول على الماء والمواد المعدنية من التربة، وثاني أكسيد الكربون من الهواء والطاقة من الشمس.

يحتوي النبات بالفعل على جميع العناصر الطبيعية (92 عنصراً) ولكنه لا يحتاج إلا 16 عنصراً أساسياً كي ينمو جيداً. ومن هذه العناصر، هناك ثلاثة عشر عنصراً من المغذيات المعدنية الأساسية التي يتبعن توافرها إما بواسطة التربة أو بواسطة الأسمدة الحيوانية أو المعدنية.

غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 يمكن اعتباره من ذاتي أكسيد الكربون إذ أنه يشكل 90% تقريباً من الوزن الجاف لبعض النباتات الخضراء وهو أيضاً من أهم المواد المعدنية في النبات.

ويصرف النظر عن الكربون والعنصرين والأوكسجين. يحصل النبات على مغذياته من التربة أساساً، وبطبيعة الحال فإن المغذيات المعدنية تدخل في ثلاثة أقسام:

١. العوامل الأساسية لنمو وتطور النبات

النباتات مثل الكائنات الحية الحيوانية تحتاج من أجل نموها وتطورها إلى جملة من العوامل الأساسية المتوازنة وإن غاب أو فقد أحد هذه العوامل من الوسط الذي به يحيى النبات سيؤدي قطعاً إلى اضمحلال وموت ذلك النبات الذي يعيش في شروط غير كاملة وغير متوازنة.

هذه الشروط أو العوامل الأساسية نلخصها فيما يلي:

الوسط الطبيعي	المناخ	الماء
		الضوء
		الحرارة
	مواد تشكيلية	غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2
	(من الجو)	العناصر الكبرى
	(من التربة)	العناصر الصغرى
	(من التربة)	

الماء : من أهم العوامل المحددة للنمو، فهو يدخل النبات عن طريق الامتصاص ويخرج منه عن طريق النتنج.

الضوء : إذا كانت الكثير من الفطريات يتم نموها وتطورها في غياب الضوء وكذلك جذور معظم النباتات لا تنمو بشكل طبيعي إلا في وسط مظلم، فإن الأجزاء الهوائية لمعظم النباتات لا تستطيع الاستمرار في الحياة إلا بوجود الضوء لأنه يشكل الحجر الأساسي في عملية الاصطناع الضوئي (photosynthesis). فالأشعة الشمسية تشكل مصدر الطاقة اللازمة لبناء المادة العضوية.

غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 : يمكن إدراك أهمية غاز ثاني أكسيد الكربون إذا علمنا أنه يشكل 50 % تقريباً من الوزن الجاف لجميع النباتات الخضراء وهو أيضاً من أهم المواد التشكيلية في النبات.

وبصرف النظر عن الكربون والهيدروجين والأوكسجين، يحصل النبات على مغذياته من التربة أساساً. وغالباً ما تصنف هذه المغذيات المعدنية إلى ثلاثة أقسام:

- عناصر أو مغذيات كبرى وهي: النتروجين، والفسفور، والبوتاسيوم التي يحتاجها النبات بكميات كبيرة.

- عناصر أو مغذيات ثانوية وهي الكالسيوم، والمغنيسيوم، والكربون والتي يحتاجها النبات بكميات أقل وإن كانت لا تزال أساسية.

- عناصر أو مغذيات صغرى وهي البوتاسيوم، والكلور، والنحاس، والحديد، والمنغنيز، والمولبدينوم، والزنك.

العناصر الكبرى والثانوية

يقصد بها العناصر التي يحتاج إليها النبات بكميات كبيرة نسبياً وهي ستة معادن: الأزوت، الفسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم، المنيزيوم، والكربون. وتؤثر هذه العناصر على نمو النبات وتضعفه إذا كانت كمياتها في التربة قليلة أو غير متوازنة مع العناصر الغذائية الأخرى.

العناصر الصغرى

هي العناصر التي يحتاجها النبات بكميات قليلة وتشمل حتى الآن عناصر الحديد، النحاس، المنغنيز، الزنك، البور، الألミニوم، والكلور. ولا تعني تسميتها بالعناصر الصغرى أنها أقل ضرورة وأهمية من العناصر الكبرى بل سميت هكذا لأن احتياجات النبات منها تكون أقل.

2. أساسيات التغذية المعدنية

تجمع النباتات الخضراء الطاقة الشمسية وتخزنها في صورة سكريات فتغطي احتياجاتها الطاقية طبيعياً وتصبح مهمة التغذية وبكل بساطة تؤمن متطلبات الاصطناع المستمر للنمو من أجل تشكيل أنسجة جديدة تعمل على تطور النبات. وإذا استثنينا غاز ثاني أكسيد الكربون فإن النبات يأخذ كل العناصر الالزمة لدوره حياته من التربة. ورغم كون العناصر التي يأخذها النبات من التربة ضئيلة في نسبتها فإنها من أهم دعائم الحياة.

ويبيّن الجدول التالي التركيز الكيميائي للقشرة الأرضية والسبة المئوية لمكونات الرماد عند بعض النباتات.

نسبة في الرماد (%)			نسبة في القشرة الأرضية (%)	العنصر
البرسيم	البطاطس	القمح (حب)		
0.04	0.10	0.02	7.40	Al الألمنيوم
0.11	0.70	0.70	4.20	Fe الحديد
27.40	1.80	2.00	3.25	Ca الكالسيوم
4.10	3.00	6.00	2.10	Mg المنيزيوم
2.10	2.20	0.15	2.40	Na الصوديوم
22.80	50.00	27.00	3.30	K البوتاسيوم
4.80	2.60	0.70	0.15	S الكبريت
4.20	7.50	22.00	0.10	P الفسفور
0.02	0.02	0.07	0.08	Mn المنغنيز
0.10	0.02	0.05	0.01	B البير
0.02	0.02	0.04	0.01	Cu التحاس



أثبتت البحوث العلمية أن هناك عناصر غذائية أساسية لنمو النبات وإن تاجه، وبدونه لا يمكن للنبات أن ينمو ويكمم دورة حياته ولكي نعتبر العنصر الغذائي ضروري عليه أن يتصرف بالميزات التالية :

- يؤدي غيابه إلى وقف النمو أو إلى ظهور أعراض نقص على النبات تكون إلى حد ما مميزة وخاصة بالعنصر وأن هذه الأعراض لا يمكن إزالتها إلا بإضافة العنصر المسؤول.

- يجب أن لا يكون العنصر قابل لاستبدال بعنصر آخر

فالعناصر الأساسية هي التي تمكن النبات من إكمال دورة حياته. وعدم وجود أو نقص أحد هذه العناصر لا يعوض بزيادة أو توفر عنصر آخر وينتج عنه ظهور أعراض معينة على النبات تدعى بأعراض نقص العنصر.

لإفادة النبات لابد من وجود العناصر في التربة على أشكال قابلة للامتصاص وبتركيزات مناسبة لنمو النبات. ولابد من وجود توازن مناسب بين تركيزات العناصر الغذائية المختلفة الذائبة في محلول الأرضي. مثلاً الكلسيوم قد يتداخل في تغذية النبات مع الفسفور والبورون وربما أدى إلى اصفار عام نتيجة قلة الإفادة من الحديد أو المنغنيز أو الزنك.

تقييم خصوبة التربة

يعتمد إنتاج المحاصيل على توفر العناصر الغذائية الالازمة للنبات في التربة وعلى وجودها بأشكال قابلة للامتصاص. وتختلف الأرضي في احتياجاتها بين عنصر وآخر حسب توفره بصورة طبيعية بأشكال مفيدة للنبات. وأن عدم توفر عنصر أو أكثر بكثيات وأشكال تفي بحاجة النبات يجعل من الضروري تزويد الأرض بهذا العنصر للحصول على إنتاج جيد. وان معرفة متطلبات النبات وتقييم خصوبة التربة لأمر هام في تحديد نمو النبات وإن تاجه.

طرق تقييم خصوبة التربة:

استعمل الباحثون القدماء طرق التحليل الكيميائية للتعرف على أسباب عدم إنتاجية التربة. وتطورت طرق التحليل تطوراً كبيراً في اتجاه تحسينها بهدف التنبؤ عن خصوبة التربة وكثبيات العناصر القابلة للإفادة فيها. وقد استعملت طرق أخرى بيولوجية باستعمال النبات

نفسه أو الكائنات الحية الدقيقة للتعرف على خصوبة التربة وتتوفر العناصر الغذائية فيها. واعتمدت الطرق البيولوجية على دراسة النمو النباتي والكميات المستخلصة من العناصر الغذائية أو إعداد الكائنات الحية الدقيقة أو نمو انتشار الأجزاء الخضرية لها. وتستعمل حالياً اختبارات مختلفة للدلالة على حالة الخصوبة وتتلخص فيما يلي:

– اختبار أعراض نقص العناصر على النبات.

– تحاليل التربة.

– اختبارات بيولوجية.

– التحليل النباتي.

اختبار أعراض نقص العناصر:

تقوم كثير من الطرق والمعاملات على أساس ملاحظة أعراض نقص العناصر الأساسية على النبات. وتتلخص هذه الأعراض في التالي:

– وقف النمو النباتي التام.

– ضعف النمو النباتي الشديد.

– أعراض معينة على الأوراق خلال فترات النمو.

– نضج متاخراً أو غير طبيعي.

– قلة الإنتاج وعدم جودة المحصول.


وتظهر مثل هذه الأعراض لعدم سير العمليات الحيوية في النبات سيراً طبيعياً إما للتكرار بعض الأحتمالات العضوية أو النواتج الوسيطة أو لفقد النبات ببعض المركبات نتيجة نقص العنصر وأساسيته في سير هذه العمليات الحيوية.

ويرتبط كل عرض من هذه الأعراض بوظيفة معينة للعنصر الذي يفتقر إليه النبات مما يجعل من الصعب في كثير من الأحيان تفسير السبب الفسيولوجي للأعراض ولا سيما أن للعنصر عدداً من الوظائف التي يقوم بها في النبات. وعلى سبيل المثال تبدو الأوراق النباتية عند نقص عنصر النيتروجين خضراء شاحبة أو صفراء فاتحة لانخفاض إنتاج الكلورو菲ل وظهور اللون الأصفر لكن هناك نقص عناصر أخرى يعطي نفس الأعراض.

تجرى تحاليل التربة لمعرفة قدرة الأرض على تزويد النبات بالعناصر الأساسية ولتقييم خصوبة التربة قبل حدوث النقص في العناصر. ورغم أن هذه التحاليل تبين مستوى المعادن في التربة فهي لا تدل على الكميات الواجب إضافتها لسد حاجيات النبات المزروع أو للحصول على أحسن إنتاج اقتصادي ممكن، فلابد من معادلة نتائج التحاليل مع تجارب حقلية حول كمية العناصر التي يجب إضافتها بالنسبة لمختلف أنواع التربة.

النقطة المهمة في تحليل التربة هي أن تكون العينات الترابية ممثلة للمنطقة أو الحقل المراد تحليله. وغالبا لا تتجاوز العينة الترابية كيلوغرام واحد الذي يمثل مساحة متجانسة من 10 إلى 15 هكتار الشيء الذي يجعل احتمال الخطأ واردا والذي يمكن أن يترتب عنه خطأ في التحاليل وكذا في التوصيات التي تبني على أساس نتائج التحاليل. لهذا يجب أن تكون العينة المرسلة إلى المختبر مركبة من خلط عينات مأخوذة من أماكن مختلفة من الحقل.

تكون العينة المركبة المرسلة للتحليل من خلط عينات مأخوذة من أماكن مختلفة من الحقل لا تبدي اختلافا ظاهريا عن بعضها أو لم تعامل معاملة خاصة من ناحية الأسمدة أو المركبات الأخرى والغرض من ذلك هو التقليل من أثر عدم التجانس في التربة.



6. Prélever 200 à 500 grammes de sol sur les côtés.
7. Déposer chaque prélevement dans le récipient.
8. Mélanger les prélevements effectués.



Fig. 1. Zones homogènes pour l'échantillonnage.




Fig. 2. Profils de sol enfoncés dans la profondeur.

تبين لنا الصورة كيفية تقسيم الحقل إلى مناطق متجانسة وطريقة وكيفية وأدوات أخذ العينات.

ينص هذا القانون على أن الإنتاج يحدده العنصر الممثّل بأضعف كمية في التربة، بمعنى أن الإنتاج يزداد فقط بإضافة المعden الموجود بتركيز ضعيف في التربة وأن العلاقة تأخذ شكل خط مستقيم حتى يدخل معنـد آخر ليصبح عـاماً مـهـداً جـديـداً. ويمكن تمثيل هذا القانون بالبرميل المصنوع من الخشب بحيث أن كمية الماء التي يمكن حزنها في البرميل تكون موازية لطول أقصر عمود مكون للبرميل (انظر الصورة).

كميات المواد الغذائية الممتصصة



الإنتاج قـنـطـار فـيـ الـهـكـتـار	N	P	K	المنتج
	كـلـاجـ فـيـ الـهـكـتـار			
22	57	11	40	القمح
27	78	16	47	الشعير
95	260	46	172	الذرة

يبين لنا الجدول أن الاحتياجات من المواد الغذائية تختلف حسب المحاصيل وحسب إمكانية الإنتاج.

3. دور وأعراض النقص بالنسبة للعناصر الكبرى

الأزوٌوط (كتلة بناء الحياة) :

غالبية الأزوٌوط الموجود بالتربيـة تأتي من الغلاف الأرضي الذي يتوفـر على كـمـيـةـ غيرـ مـحـدـودـةـ. إنـ 78%ـ مـنـ الـهـوـاءـ الـذـيـ نـتـفـسـهـ عـبـارـةـ عـنـ نـيـتـرـوجـينـ وـكـلـ هـكـتـارـ مـنـ سـطـحـ الـأـرـضـ يـغـطـيـهـ حـوـالـيـ 84.000ـ طـنـ مـنـ الأـزوـوطـ. إـنـهـ غـازـ خـامـلـ لـابـدـ مـنـ إـتـحـادـهـ مـعـ عـنـاصـرـ أـخـرىـ حـتـىـ يـسـطـيعـ النـبـاتـ اـسـتـخـادـهـ.

ما هو دور الأزوت؟

يمثل الأزوت للنبات ما يمثله البترول للسيارة. إنه ضروري لتركيب الكلورفيل وكجزء من جزئيات الكلورفيل يدخل في عملية التمثيل الضوئي. إن نقص الأزوت، والكلورفيل يدل على أن النبات لا يستخدم ضوء الشمس كمصدر للطاقة للقيام بمهام امتصاص الغذاء.

الأزوت عنصر أساسي للفيتامينات ومنظم الطاقة في النبات وهو أيضاً عنصر أساسي للأحماض الأمينية التي تعطي بروتينات النبات، وهو مسؤول مباشر عن زيادة البروتين.

ما هي أعراض النقص؟

نقص الأزوت يقلل تركيب البروتين وهذا ينتج عنه تراكم الكاربوهيدرات في أنسجة النبات، وهذا يؤدي إلى:

– لإعاقة النمو، ضعف تطور الجذور ونقص الأوراق.

– إن نقص إنتاج الكلورفيلي يؤدي إلى اصفرار أوراق وفروع النبات وبيداً الاصفرار في الأوراق القديمة ومع اشتداد النقص ينتقل للأوراق الجديدة.

– اصفرار الصلع الأوسط في أوراق النبات يعتبر نموذجاً لأعراض النقص.

– نقص الأزوت يقلل المحصول وجودة الثمار ومن ناحية أخرى فإن النيتروجين الزائد يؤدي لنمو مفرط مما يقلل من مقاومة النبات للأوبئة والأمراض كما يؤخر نضج النبات.



الصورة تبين نقص الأزوت في الذرة ويؤدي النقص في الأزوت إلى اصفرار الأوراق المسنة وبيداً من رأس الورقة في القاعدة

يعتبر الصخر الفوسفاتي المصدر الرئيسي لصناعة الأسمدة الفوسفاتية. وتوجد هذه الصخور في مناطق مختلفة من العالم إلا أن تركيبها وسهولة الحصول عليها يختلف من مكان إلى آخر. وتوجد عادة في شكل طبقات رسوبية تتراافق فيها المواد الفوسفاتية بالطين والأحجار الكلسية ومواد أخرى. ويعتبر الصخر الفوسفاتي أقل قابلية لامتصاص ثابته وعدم قابليته للذوبان.

ما هو دور الفوسفور:

- الفوسفور جزء من عملية بناء الجينات والكروموسوم ويدخل بصورة جوهرية في عملية نمو النبات وتطوره وكذلك في إنبات البذور.

- يلعب الفوسفور دوراً في عملية تنفس النبات وتخزين وتحويل الطاقة،

- انقسام الخلية، وعمليات أخرى في حياة النبات.

- يحفز تطور الجذور، الإزهار، الإثمار وتحسين البذور وبدونه لا تثمر البذور.

- يسارع في نضج الثمار ويساعد نوعية الثمار والخضروات ومحاصيل الحبوب وهو عامل جوهرى في تشكيل البذرة.

- يساهم في قدرة النباتات على التحمل،

ما هي أعراض النقص:

- المؤشر الأول لنقص الفوسفور تأخر نمو النبات والأعراض المرئية الأخرى غير أن تأخر النمو ليست واضحة كما في نقص النيتروجين والكالسيوم.

- اللون الأرجواني أو الضارب للحمرة والذي يرافقه تراكم السكر كثيراً ما يظهر على الأوراق في حالة نقص الفوسفور، خصوصاً مع انخفاض درجة الحرارة.

- اللون الأرجواني الضارب للحمرة للأوراق هو الوصف النموذجي لأعراض نقص الفوسفور. وفي بعض مراحل النمو قد يسبب نقص الفوسفور ظهور اللون الأخضر الغامق على المحصول.



الصورة تبين أعراض نقص الفسفور في الذرة والذي يكون على شكل تكون لون وردي في الأوراق النامية. علماً أن أعراض نقص الفسفور غير معتادة في الحقول.

البوتاسيوم

هناك الكثير من التربات الحاوية على عنصر البوتاسيوم في مناطق مختلفة من العالم. ويتركب معظم هذه التربات من كلوريد البوتاسيوم مخلوطة مع كلوريدات وسلفات الكلسيوم، والصوديوم، والمعنسيوم. وتذاب الأملاح المستخرجة من هذه التربات في الماء ويسمح لها بالتبlier من جديد لتنقيتها وتركيزها.

ما هو دور البوتاسيوم :

يؤثر البوتاسيوم على نمو النبات وتطور المحصول بعدة طرق:

- ينشط الكثير من أنظمة الأنزيمات
- يساعد في التمثيل الضوئي وتشكيل الغذاء
- ينتج ألياف غنية بالنشا ويعزز تغيير مواضع السكر والنشا
- زيادة محتوى بروتين النبات وبناء السليلوز
- زيادة نمو الجذور وتحسين مقاومته للجفاف
- بناء المقاومة ضد أمراض المحاصيل
- تقليل تسمم الصوديوم في التربة الملحية والقلوية.

ما هي أعراض نقص البوتاسيوم :

تظهر أعراض نقص البوتاسيوم بصورة عديدة أشهرها

– إسمرار وتحرق أطراف أوراق النبات.


– التحرق يظهر أولاً في الأوراق القديمة في كثير من النباتات.

– النباتات التي ينقصها البوتاسيوم تكون بطيئة النمو

– أنظمة الجذور والسيقان تكون ضعيفة


– البذور والثمار تكون صغيرة وذابلة

– كما تكون مقاومة النباتات للأمراض ضعيفة.



تبين لنا هذه الصورة أعراض نقص البوتاسيوم على الذرة والذي يكون على شكل اصفرار حواش الأوراق النامية.

دليل أعراض نقص العناصر الغذائية



٤. الأسمدة

بيّنت البحوث أن الإنتاج يزداد بازدياد الوحدات السمادية المضافة للتربة حتى منسوب معين ثم يأخذ بعده منحنى غير مناسب مع الوحدات السمادية الجديدة فإذا حلّنا العوامل المسؤولة عن زيادة الإنتاج في الزراعة الحديثة نجد أن حوالي 50 % من هذه الزيادة راجع إلى استعمال الأسمدة الكيميائية التي باستطاعتها رفع سقف الإنتاجية إلى حد لا يمكن تجاوزه ضمن الشروط الاقتصادية المعقولة. فالأسمدة إذن من أهم العوامل المسؤولة عن زيادة الإنتاج لأنها توفر العناصر الغذائية الالزمة لنمو وتطور وإنتاجية النبات على أن تضاف بالشكل الذي يحقق التوازن بين العناصر الغذائية.

وتنقسم الأسمدة المستعملة في تخصيب التربة إلى أسمدة عضوية وأسمدة معدنية. فالأسمدة العضوية المتمثلة في بقايا النباتات والحيوانات استعملت لفترة طويلة جداً في تخصيب الأراضي المستغلة في الزراعة الواسعة بقصد تعويض ما يفقد من العناصر الغذائية عن طريق النباتات المزروعة أو الرشح بواسطة مياه الصرف إلا أن المادة العضوية لم يكن باستطاعتها تعويض كامل ما تفقده التربة، مما جعل الإنسان يبحث عن طريق يحل بها مشكلة

سوء الإنتاج فعمد إلى إراحة التربة عام وزراعتها عام آخر أو عامين وبقي الوضع هكذا حتى الثلث الأول من القرن الماضي إلى أن درس الباحثون قواعد نظرية التغذية المعدنية حيث بدأ البحث عن مصادر معدنية للعناصر الغذائية. وتطورت صناعة الأسمدة الكيميائية فيما بعد وأخذت على عاتقها مسؤولية حل مشكلة الخصوبة وسوء الإنتاج. وإلى الأسمدة يعود الفضل في زيادة إنتاج الحبوب (مثلاً) من 1000 كغ/هكتار قبل مائة عام إلى 5000 كغ/هكتار في الوقت الحالي، هذه النتائج الباهرة جعلت المزارعين يغضون النظر عن استعمال الأسمدة الغضوية ظناً منهم أن الأسمدة المعدنية تلبي متطلبات التربة والإنتاج، وبعد فترة من الزمن وجدوا أن الأسمدة العضوية ضرورية لتأثيرها العام على بناء التربة والنظام المائي وكذلك النشاط الحيوي إضافة إلى أن المواد العضوية ترفع من كمية العناصر المعدنية الالزامية لتغذية النبات. ولقد بينت التجارب أن استعمال السماد المعدني والعضوي في وقت واحد كان دائماً أفضل من استعمال السماد المعدني لوحده.

الأسمدة الأزوطية

هناك عدة أنواع من الأسمدة الأزوطية الموجودة في السوق وتحتلت نسبة الأزوط المئوية فيها من 21 إلى 46 % ونخص بالذكر:

• سلفات الأمونيوم $[(\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4]$

هذا السماد غير فعال إذا استعمل كسماد التغطية وذلك راجع إلى أنه غير قابل للذوبان بسرعة. وفي حالة استعماله فسوف يتعرض للضياع على شكل الأمونياك (NH_3). للرفع من فعالية هذا السماد يجب استعماله قبل الزرع. هذا السماد يحتوي بالإضافة إلى الأزوط على 24 في المائة من الكبريت وهذه النسبة تعطيه مزايا أخرى بالنسبة للأراضي الكلسية بحيث أن استعماله يزيد في حموضة التربة وبذلك يسهل امتصاص النبات لمواد معدنية أخرى كالفسفور.



• الأمونترات $[\text{NH}_4\text{NO}_3]$

- سماد قابل للذوبان، ذات فعالية عالية عند استعماله كسماد التغطية. من معوقات هذا السماد نجد:

- سماد يمتص الماء الموجود في الهواء بسهولة الشيء الذي يجعله صعب للتخزين وكذا صعب للاستعمال.


- وجود هذا السماد قرب المحروقات يمكن أن يكون انفجاراً قوياً قد يؤدي إلى خسائر جسيمة.

- سماد قابل للضياع إذا تم استعماله في ظروف غير ملائمة.



• الأوريا [CO(NH₂)₂]

سماد يحتوي على نسبة عالية من الأزوت. سريع الذوبان، وسهل الاستعمال. يوفر الأمونيوم (NH₄) والنترات (NO₃) للنبات. وهو مثل الأسمدة الأخرى معرض للضياع إذ لم يستعمل بطريقة صحيحة.



الأسمدة الفوسفاتية

يعد السوبر فوسفات السماد الفوسفاتي الرئيسي في الوقت الحاضر وهناك نوعان من هذا السماد، نوع عادي يحتوي على 16-21% من خامس أكسيد الفوسفور (P₂O₅) ونوع آخر مركز ويحتوي على 44-52% من خامس أكسيد الفوسفور (P₂O₅).

إن ذوبان الأسمدة الفوسفاتية في التربة أقل سرعة من الأسمدة الأزوتية. لهذا يجب إضافة هذه الأسمدة إلى التربة قبل الحرج وتغطيتها بالترابة لتكون الاستفادة عالية.

الأسمدة البوتاسية

أكثر الأسمدة البوتاسية المستعملة تجارياً هي كلوريد البوتاسيوم وسلفات البوتاسيوم ونترات البوتاسيوم.

إن كل أملاح البوتاسيوم المستعملة كسماد قابلة للذوبان في الماء ويستعملها النبات مباشرة على شكل أيونات البوتاسيوم. تضاف الأسمدة البوتاسية عند الزراعة كالأسمدة الفوسفاتية، ويشبه البوتاسيوم الفوسفات في أن جزءاً منه يثبت في التربة على شكل مركبات غير قابلة للامتصاص.

% نسبة البوتاسيوم (K_2O)	الرمز الكيماوي	السماد
63-48	KCl	كلوريد البوتاسيوم
53-50	K_2SO_4	سلفات البوتاسيوم
44 (13 N%)	KNO_3	نترات البوتاسيوم

الأسمدة المختلطة أو المركبة

تختلف الأراضي في قابليتها لتزويد المحاصيل بالمواد الغذائية الازمة كما تختلف حاجيات المحاصيل من هذه المواد، وعندما تفتقر الأرض لأكثر من عنصر، يجب استعمال الأسمدة المركبة التي تحتوي على أكثر من عنصر. من بين الأسمدة المركبة الموجودة في السوق هناك الأسمدة التي تحتوي على ثلاثة عناصر (الأزوت% - الفوسفور% - البوتاسيوم%) مثل 14-28-14، وهناك الأسمدة التي تحتوي على عنصرين (الأزوت- الفوسفور) مثل 18-46 و 19-38.

5. التوصيات

الأسمدة كما سبق الذكر، تشكل العنصر الأساسي في تغذية النبات فعلى الصعيد العالمي، تقول الإحصائيات أن أكثر من ثلث الزيادة في المردودية الفلاحية ناتج عن استعمال الأسمدة الكيماوية. ورغم هذا، فعلى الصعيد الوطني نجد أكثر من 90% من الأسمدة المستعملة في الميدان الفلاحي تستعمل في المناطق المسقية والمناطق ذات التساقطات السنوية التي تفوق 500 ملم. هذا يعني أن المناطق الجافة وشبه الجافة والتي تشكل قسطاً وافراً من الأراضي الفلاحية بالمغرب تستفيد بأقل من 10% من الأسمدة المستعملة.

الأسمدة، رغم مساهمتها في زيادة الإنتاج فإنها لا تكون فعالة إلا إذا استعملت بطريقة علمية. هذه الطريقة يمكن تفصيلها إلى نقطتين: الكمية والنوعية.

بالنسبة للكمية، يجب أن نعلم أن كل نوع من النباتات له احتياجات خاصة به، يعني أن كمية المواد الغذائية المعتادة من الأرض تختلف حسب المزروعات. من هذا المنطلق يمكن أن يؤثر بطريقة سلبية على المحصول الزراعي في حالة إضافة كميات أقل أو أكثر من احتياجات المزروع.

أما بالنسبة للنوع هناك 16 مادة غذائية أساسية للنبات إنما بصفة عامة نجد ثلاثة أنواع من بين هذه المجموعة الذين يشكلون القسط الواfir من الغذاء وهم الأزوٌط، الفسفور، البوتاسيوم.

كيف يمكن لنا ان نعرف كمية ونوعية السماد الذي يجب إضافته؟

الطريق الأنفع هو تحليل التربة قبل زرع المزروع في المختبرات المخصصة لذلك. تحاليل التربة تمكّنا من معرفة كميات المواد الغذائية الموجودة في التربة والقابلة للأمتصاص وهذه الكمية تكون بالنسبة للباحث أو المرشد كقاعدة لتحديد كمية ونوعية السماد الذي يجب إضافته.

الوصيات المبنية على تحاليل التربة تساعد على الرفع من الإنتاج و تقلص من التأثير السلبي لهذه المواد الكيماوية على الموارد الطبيعية وأخص بالذكر هنا القدرة الإنتاجية للتربة و جودة المياه الجوفية و السطحية.

أسمدة العمق

أسمدة العمق هي الأسمدة التي تضاف للترابة قبل الزراعة والتي يجب تغطيتها بالترابة عن طريق الحرج حتى ترفع من نسبة استعمالها وهي بصفة عامة الأسمدة المركبة والأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية.

أسمدة التغطية بالنسبة للحبوب

أسمدة التغطية، تهم بالأخص الأسمدة الأزوٌطية، ويوجد الأزوٌط في التربة على شكلين أساسيين، الشكل العضوي ويمثل أكثر من 95% من محتويات التربة من الأزوٌط: والشكل المعدني ويكون من عدة أشكال: الـنـتـرات (NO_3^-), الأمـونـياـك (NH_4^+), النـتـريـت (NO_2^-)

وأكسيدات الأزوت (NO) ويمثل حوالي 5% . الأشكال التي تكون الغذاء الأزوتوي بالنسبة للنبات هي النيترات (NO₃) والأمونياك (NH₄).

إن النبات يفضل الأمونيوم في طور نموه المبكر والنيترات فيما بعد ذلك، لهذا يجب توفير الشكلين معاً في التربة.



الوقت الملائم لإضافة الأسمدة

الأوقات الملائمة لإضافة السماد الأزوتوي بالنسبة للحبوب هي:

– قبل الزرع، ويجب إضافة كمية لا تقل عن 20 وحدة أو حسب الكمية الموجودة في التربة

قبل سقوط الأمطار ومن الأفضل الاعتماد على تحليل التربة لمعرفة هذه الكمية.

– عند بداية التفريخ، أي حوالي شهر ونصف من وقت الزرع يجب إضافة ما يعادل حوالي

قنطار من الأمونترات في الهكتار.

– في بداية ظهور السنبلة نصف قنطار من الأمونترات في الهكتار إذا كانت الأحوال

المناخية تتطلب ذلك.

وبصفة عامة فكل قنطار من الحبوب يستهلك 5,3 كلغ من الأزوت. التربة يمكنها أن تعطي بين 50 و100 كلغ من الأزوت في السنة وذلك حسب التربة والظروف المناخية. الكمية المختلفة يمكن أن تصل إلى 50% وذلك حسب التربة والظروف المناخية.

وبحسب هذه المعادلة يجب إضافة 140 وحدة أزوتية لإنتاج 4طنان من الحبوب. إذا افترضنا أن التربة ستتوفر 100 كلغ وأن نسبة الضياع هي 50 %، فالكمية التي يجب إضافتها هي 90 وحدة أزوتية.

الزراعة المنسقية	الزراعة البعلية	الوقت
46 وحدة (قنتار في الهاكتار %46)	30-20 وحدة (قنتار في الهاكتار %33)	بداية التفريخ
46 وحدة (قنتار في الهاكتار %46)		نهاية التفريخ
46 وحدة (قنتار في الهاكتار %46)	30-20 وحدة (قنتار في الهاكتار %33)	عند تكوين السنبلة

للاستفادة من سماد التغطية يجب أخذ بعين الاعتبار ما يلى :

- استعمال السماد المناسب (الأمونترات أو الأوليريا) حسب حالة المزروع:

- اصغار ظاهر يجب استعمال الأوريا (%)46
 - اصغار غير ظاهر يجب استعمال الأمونترات (%)33

- المناخ المناسب (وفرة الماء)

- إضافة السماد بعد الظهر لتقليل نسبة الضياع الناتجة عن تبخر الأزوت.

**مديرية التعليم، والتقوين والبحث
قسم الإرشاد**

**شارع محمد بالعربي العلوي ، ص. ب. 6598 ، الرباط المعاهد
الهاتف : 05 37 77 69 25/24 - 05 37 77 64 50
الفاكس : 05 37 77 81 42 / 05 37 77 65 51
ردمك : 9954-447-24-5
الإيداع القانوني : 2007/0463**